

Số: 142/UBND

Về việc thực hiện các biện pháp
phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa
năm 2024

Hồng Tiến, ngày 01 tháng 8 năm 2024

Kính gửi:

- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo SXNN phường;
- Các ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố.

Hiện nay trên địa bàn phường Hồng Tiến lúa mùa sớm đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh - Đứng cái - Làm đòng; Lúa mùa trung đang giai đoạn đẻ nhánh - đẻ nhánh rõ; Cây lúa sinh trưởng khá. Do thời tiết nắng nóng kèm mưa rào xen kẽ thuận lợi cho sâu bệnh hại phát sinh phát triển.

Thực hiện Số: 610/HD-CCTT&BVTV, ngày 01/8/2024 về việc hướng dẫn phòng trừ sâu hại cây trồng của Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên.

Để đảm bảo an toàn sâu bệnh và năng suất cho cây lúa vụ mùa, UBND phường Hồng Tiến đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo sản xuất phường, các ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố hướng dẫn, thông báo cho nhân dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện và phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại sau:

1. Đối với sâu cuốn lá nhỏ hại lúa

Trường thành đã xuất hiện rải rác với mật độ trung bình 0,1 con/m², nơi cao 0,3 con/m², dự kiến ra rộ từ ngày 6/8 đến ngày 14/8. Dự báo sâu non sẽ nở rộ từ 10/8 đến 20/8, gây hại trên các trà lúa, đặc biệt gây hại nặng trên trà lúa mùa sớm giai đoạn làm đòng.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến trưởng thành, xác định thời điểm sâu non nở, đặc biệt chú ý trên trà lúa Mùa sớm, trung giai đoạn đứng cái - làm đòng. Phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ những ruộng có mật độ sâu non trên 20 con/m², đối với những ruộng có mật độ sâu non trên 100 con/m² cần phun kép 2 lần cách nhau từ 4 - 5 ngày.

Thuốc dùng phun trừ sâu là các loại thuốc đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV trừ sâu cuốn lá được phép sử dụng ở Việt Nam ví dụ như: Ebenzoate 5WG; Sherdoba 20EC, 55WG; Virtako® 40WG; Neretox 18 SL, 95WP; Cyfitox 300EC; Clever 150SC, 300WG; Mekomectin 3.8EC, 135WG; Boxing 99.99EW; Indogold 150SC; Footsure 108WG; Emacao-TP 75WG;

2. Đối với sâu đục thân 2 chấm hại lúa

Trường thành sâu đục thân 2 chấm đã xuất hiện rải rác, dự kiến ra rộ từ 7/8 đến 18/8; Sâu non xuất hiện rải rác từ ngày 14/8, dự báo sâu non nở rộ từ 15/8 đến 27/8, gây ung đòng, bạc bông trên trà lúa Mùa sớm, gây dàn héo trên lúa Mùa trung.

Theo dõi diễn biến của trưởng thành, mật độ ô trúng và thời điểm sâu non nở đặc biệt trên những ruộng đang trong giai đoạn đúng cái - làm đồng - trỗ.

- Sử dụng thuốc phun trừ sâu cho những ruộng lúa đang trong giai đoạn làm đồng, có mật độ ô trúng trên $0,3 \text{ ô}/\text{m}^2$ ($3 \text{ ô}/10\text{m}^2$), thời điểm phun khi sâu non mới nở, những ruộng có mật độ ô trúng cao trên $1 \text{ ô}/\text{m}^2$ ($10 \text{ ô}/10\text{m}^2$) cần tiến hành phun kép 2 lần cách nhau từ 4 - 5 ngày.

- Sử dụng một trong các thuốc trừ sâu đặc thân hại lúa được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam ví dụ như: Boxing 405EC; Pertox 5EC, 100EW, 250WP; Shepatin 90EC; Netoxin 90WP; Tridan 21.8WP; Confitin 18EC; Reasgant 3.6EC; Gà nòi 95SP...

3. Đối với bệnh khô vằn hại lúa

Áp dụng tổng hợp các biện pháp chăm sóc cây lúa khỏe, bón phân cân đối, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện ổ bệnh, phun thuốc trừ bệnh bằng một trong các loại thuốc trừ bệnh khô vằn hại lúa được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam ví dụ như: Anvil® 5SC; Tilt Super® 300EC; Validacin 5SL; Mekongvil 5SC; Daconil 75WP, 500SC...

4. Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện ổ bệnh, chú ý sau mỗi trận mưa giông lớn, phun thuốc trừ khi bệnh xuất hiện kết hợp với các biện pháp canh tác khác như: dừng ngay bón phân đậm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá và luôn giữ đủ nước trong ruộng. Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam để phun trừ ví dụ như: Tokyo-Nhật 220WP; Xantocin 40WP, Sansai 200 WP; Totan 200WP, Ychatot 900SP; Sieu sieu 250WP; PN-balacide 32WP; Stifano 5.5SL ... Sau khi phun thuốc 5 - 7 ngày, nếu bệnh chưa dừng phải tiến hành phun lại.

Chú ý: Đảm bảo tuân thủ thời gian cách ly, nồng độ, liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì. Với lúa đang trỗ, chỉ được phun vào buổi chiều mát.

Ngoài ra cần tập trung theo dõi một số đối tượng như rầy nâu, lุง trắng; bệnh lùn sọc đen, bệnh vàng lui, chuột trên các trà lúa vụ mùa.

Trên đây là chỉ đạo của UBND phường Hồng Tiến về việc thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa năm 2024 trên địa bàn phường. UBND phường đề nghị thành viên BCD sản xuất phường, các ông, bà tổ trưởng TDP tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân được biết và áp dụng các biện pháp chăm sóc, phòng trừ kịp thời, có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- TT Đảng uỷ, HĐND(b/c);
- Như kính gửi;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Chinh

